

Title	鷺口瘡ノ塩酸加里療法
Author(s)	S.N.生
Journal	歯科醫學叢談, 2(5): 48-49
URL	<a href="http://hdl.handle.net/10130/423">http://hdl.handle.net/10130/423</a>
Right	

著者ハ四十名ノ患者ニ對スル實驗ニ基キ左ノ報道ヲ與ヘリ左ノ如シ

(一) 流集作用ヲ以テ「ガアヤコール」古加因ヲ表皮及皮下ノ組織ニ送輸スルキハ此部ニ完全ナル知覺脫失ヲ喚起ス但シ電流ノミニ由ルモ亦「ガアヤコール」溶液其モノトシテモ各深部ノ知覺脫失ヲ起サス

(二) 知覺脫失ハ電流ヲ以テ「ガアヤコール」古加因溶液ヲ七分時半ノ間貼用スル後チニハ確ニ發揮シ、十乃至十五分時間持續ス

(三) 電流強度ハ知覺脫失ノ目的ヲ達スルマテニハ〇、二乃至〇、四「ミリアンペール」ノ間ニ在リトス

(四) 患者ハ神識ニ於テ明瞭ニシテ、殆ンド電流ヲ感受セス、拔齒術等ニ際シ極微ノ疼痛ヲ

モ感覺セス、且ツ毫モ後發作用アルヲ見ス

(五) 「ガアヤコール」不傳導體トナリテ古加因溶液ヲ一局部ニ限制セシメ、人體内ニ於ケル其吸收ヲ緩慢ナラシメ、是ニ由リテ其有害性後作用ヲ豫防ス

(六) 予ハモルトンノ使用スル鹽酸古加因ノ代リニ沃度水素酸古加因ヲ用ユ

### ○ 齶口瘡ノ鹽酸加里療法

アマデオ、レウキー氏

著者ハ齶口瘡ニ鹽酸加里ヲ稱用ス就中内外ノ兩法ヲ合用ス、著者ハモンチー氏ノ法ニ倣ヒ通常左ノ處方ヲ用ユ

處方

鹽酸加里 四、〇

沒藥丁幾 三、〇

餹水 二〇〇、〇

右混和含嗽料トシテ用ユ

又方

處方

鹽酸加里 一、〇

餹水 九〇、〇

覆盆子舍利別 一〇、〇

右混和水中ニ冷却シ、毎三時一茶ヒヲ用

ユ

只頑固ノ症及ヒ劇痛アルモノニハ撒里矢兒酸

(ヒルツ氏)或ハ昇汞ノ塗布ヲ要ス

處方

撒里矢兒酸 二、〇

亞兒個保兒 一〇、〇

倔利斯林 二〇、〇

右外用

又ハ

處方

撒里矢兒酸曹達 二〇、〇

餹水 一〇〇、〇

右外用

又方

處方

昇華水銀 〇、一

餹水 五〇、〇

右外用

(以上二項S. N. 生抄錄)

○防腐粘着膏

左ノ處方ハ顔面ノ綳帶ヲ固定スルニ最モ妙ナリ  
トイフ齒科治療上ニ應用スル事ヲ得ベシ